

## **Příbalová informace pro pacienty. Informace pro použití, čtěte pozorně!**

### PŘÍBALOVÁ INFORMACE

**Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete přípravek MALTOFER FOL tablety užívat**

- Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat znovu přečíst.
- Máte-li případně další otázky, zeptejte se, prosím, svého lékaře nebo lékárníka.
- Tento přípravek byl předepsán Vám, a proto jej nedávejte žádné další osobě. Mohl by jí ublížit, a to i tehdy, má-li stejné příznaky jako Vy.

**V příbalové informaci naleznete:**

- 1. Co je MALTOFER FOL tablety a k čemu se používá**
- 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete MALTOFER FOL tablety užívat**
- 3. Jak se MALTOFER FOL tablety užívají**
- 4. Možné nežádoucí účinky**
- 5. Uchovávání přípravku MALTOFER FOL tablety**
- 6. Další informace**

#### **MALTOFER FOL tablety**

##### **žvýkací tablety**

*(Polymaltosum ferricum, Acidum folicum)*

Léčivé látky: *Polymaltosum ferricum, Acidum folicum* – 1 tableta obsahuje 357 mg polymaltosum ferricum což odpovídá 100 mg železa [Fe(III)] ve formě komplexu s maltózou a 0,35 mg kyseliny listové.

Pomocné látky: Dextrát, mikrokrystalická celulóza, kakao, natrium-cyklamát, makrogol 6000, mastek, vanilin a čokoládové aroma.

#### **Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce :**

Vifor France SA  
7-13, Bd Paul Emile Victor  
92200 Neuilly-sur-Seine  
Francie

### **1. CO JSOU MALTOFER FOL tablety a K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ**

MALTOFER FOL tablety se užívají k léčbě a prevenci nedostatku železa a k prevenci nedostatku kyseliny listové v organismu.

### **2. DŘÍVE NEŽ ZEČNETE MALTOFER FOL tablety UŽÍVAT**

**Neužívejte MALTOFER FOL tablety:**

- Jestliže jste precitlivělý(á) na léčivé látky (polymaltosum ferricum, acidum folicum) nebo na kteroukoliv další složku přípravku Maltofer Fol tablety
- Jestliže trpíte nadměrným množstvím železa ve tkáních (onemocnění se nazývá hemochromatóza, hemosideróza)
- Jestliže trpíte poruchou využití železa např. anémie (chudokrevnost) z otravy olovem, sideroachrestická anémie, thalasemie

- Jestliže trpíte chudokrevností, která není způsobena nedostatkem železa (např. hemolytická anémie).

**Zvláštní pozornosti při užívání Maltofer Fol tablety je zapotřebí:**

- Jestliže trpíte diabetem, jedna tableta obsahuje 0.36 g sacharidů

**Užívání Maltofer Fol tablety s jídlem a pitím:**

Maltofer Fol tablety můžete užívat společně s jídlem nebo ihned po jídle.

**Těhotenství**

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék .

**Kojení**

Poradte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete užívat jakýkoliv lék .

**Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů**

Maltofer Fol tablety nemají vliv na řízení motorových vozidel ani na obsluhu strojů.

**Vzájemné působení s dalšími léčivými přípravky:**

Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval(a) v nedávné době, a to i o lécích, které jsou dostupné bez lékařského předpisu.

### **3. JAK SE MALTOFER FOL tablety UŽÍVAJÍ**

Vždy užívejte přípravek Maltofer Fol tablety podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Obvyklá dávka přípravku Maltofer Fol tablety je 1 tableta dvakrát až třikrát denně. Po úpravě hemoglobinu k normálním hodnotám by měla léčba pokračovat 1 tabletou denně nejméně do konce těhotenství, aby byly doplněny zásoby železa.

Denní dávka může být rozdělena do jednotlivých dávek nebo může být užitá najednou.

Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Maltofer Fol tablety je příliš silný nebo slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi.

**Jestliže jste užil (a) přípravku Maltofer Fol tablety více než jste měl(a):**

Až dosud nebyly po požití vyšších dávek hlášeny případy otravy nebo nadměrná zátěž železem.

**Jestliže jste zapomněl(a) užít Maltofer Fol tablety.**

Nezdvojujte následující dávku, abyste doplnil(a) vynechanou dávku.

### **4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY**

Podobně jako všechny léky, může mít i Maltofer Fol tablety nežádoucí účinky.

Velmi vzácně se mohou objevit zažívací potíže jako je pocit plnosti, tlak v nadbřišku, nevolnost, zácpa nebo průjem.

Tmavé zbarvení stolice je způsobeno přítomností železa a není klinicky významné.

Maltofer Fol tablety nepůsobí zbarvení zubní skloviny.

Jestliže zaznamenáte jakýkoliv nežádoucí účinek, který není uveden v této příbalové informaci, oznamte to, prosím, svému ošetřujícímu lékaři nebo lékárníkovi.

## **5. UCHOVÁVÁNÍ PŘÍPRAVKU MALTOFER FOL tablety**

Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

Uchovávejte při teplotě do 25°C, v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.

## **6. DALŠÍ INFORMACE**

Testy zjišťující skryté krvácení do zažívacího traktu mohou být při současném podávání léčivého přípravku falešně pozitivní.

Velikost balení : 30 tablet

Datum revize textu : 3.3.2009